

ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU A NÁSLEDNÁ PÉČE O NĚJ



Většina z nás si neumí představit zahradu bez trávniku. Je synonymem odpočinku, klidu i pohody. Ale aby byl opravdu takový jaký ho chceme mít, musíme mu věnovat pozornost, která začíná jeho založením a pokračuje celoroční péčí.

Před založením nového trávniku je nejdůležitější uvědomit si, jaký trávník chceme, co od něj očekáváme, jakou má plnit funkci a jak jsme schopni o něj pečovat. Na základě těchto informací lze začít vybírat travní směs. Jejím výběru věnujte náležitou pozornost. Je vhodné poradit se s odborníkem, který pomůže ujasnit si jaký typ travní směsi je pro vás nejvhodnější a jaké množství směsi potřebujete.



Zakládání trávniku

Máme-li plochu odplevelenou začneme s *vlastním zakládáním trávniku*. Základním předpokladem založení kvalitního trávniku je co nejrovnější povrch půdy. Ponechané nerovnosti půdy znemožňují kvalitní a rovnoměrné sekání na požadovanou výšku, zhoršují funkčnost trávniku a jeho estetický vzhled.

Hrubá příprava (terénní úpravy, rytí, orba a zapravování kompostu či hnoje) by měla být provedena na podzim před rokem výsevu.

Vlastní jemná předsetová příprava se provádí brzy na jaře, jakmile to stav půdy dovolí. U podzimního výsevu - koncem léta. U větších pozemků se používají speciální půdní kultivátory, při malých výměrách stačí pozemek překopat a uhrabat. Těsně před setím se hnojí průmyslovými hnojivy, pak se povrch utuží válením a nakonec jemně nakypří.

Kypření by nemělo být zbytečně hluboké, osivo vyžaduje „tvrdé lůžko“ a „měkkou peřinu“, aby se zajistilo vztlínání vody k semeni a zabránilo tak výparu.

Výsev

Vysévat lze od jara do pozdního podzimu s ohledem na klimatické podmínky. *Nejvhodnější termíny setí jsou jarní 15. 3. - 15. 5. a podzimní 15. 8. - 30. 9.*

Způsob setí závisí na velikosti osévané plochy. Pro velké plochy se používají sečí zařízení, malé plochy se osévají ručně. Je vhodné oddělit 20 % osiva z celkového množství jako rezervu pro případ došetí prázdných či řídkých míst.

Vlastní výsev provádíme rovnoměrným rozhozem osiva ve dvou směrech (např. ze severu na jih a z východu na západ). Tím docílíme rovnoměrné rozptýlení osiva. Vyséváme na povrch nebo jen velmi mělce. Po zasetí osivo jemně zapravíme do půdy a plochu mírně utužíme, aby se vytvořily příznivé podmínky pro vzházení. Osivo musí být i po zapravení v hloub-

Příprava plochy

Před vlastním zakládáním trávniku je nutné se věnovat *přípravě plochy*. Důležité je *odstranění plevelů*, hlavně vytrvalých (pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha aj.). Tyto plevele lze v trávniku jen obtížně ničit. Odstraňují se aplikací neselektivního herbicidu za jejich intenzivního růstu. Pro dostatečné působení je nutné nechat účinkovat herbicid minimálně 14 dnů. Při silném zaplevelení se ale stává, že část rostlin nevyklíčí a aplikace se musí opakovat. Proto je ideální provádět úpravy v roce předcházejícím založení porostu. Před zimou pak provést nakypření orbou či rytím a sít co nejdříve z jara.





ce max. 0,5 - 1 cm. Na velké plochy se používají lehké rýhované a hladké válce. U malých ploch stačí, když provedeme „zasekání“ semen železnými hráběmi a pak povrch utužíme (např. šlapáním po dlouhé desce). Zásev provádíme nejlépe za bezvětří a při optimální vlhkosti půdy (ne za mokra).

Pamatujte, že dostatek vody je pro vzhled trávníku jedním z nejdůležitějších faktorů. Na druhé straně dlouhodobý přebytek vody škodí. Zavlazování plochy před vzejitím trávníku provádíme jen v nejnужnějších případech. Jsme-li přesto nuceni zavlazovat, přistupujeme k tomu tak, aby závlaha byla rovnoměrná a nedocházelo k přemísťování semen (splavení). Závlaha musí být pravidelná, aby nám naklíčená semena nezaschla. Zavlazujeme minimálně do vývoje 3 lístků trávy. Závlahu provádíme vždy večer, kdy nižší teploty v noci snižují výpar, čímž je zajištěn vyšší účinek závlahy.

Péče o trávník

Založením trávníku péče o něj nekončí, ale začíná. *Následná péče spočívá v kvalitním sekání, dodávání živin, průběžném odstraňování plevelů a ochraně proti chorobám a škůdcům.*

První sekání po výsevu provádíme na výšku zhruba 5 cm, ale ne dříve než po náležitém zakořenění trávníku tj. přibližně při výšce 10 cm. Při sekání používáme sekačku s ostrým a dobře seřízeným žacím ústrojím, aby nedošlo k poškození nově vytvořeného kořenového systému. Výšku sekání v následných secích postupně snižujeme až k optimální požadované výšce daného typu trávníku (u parkových trávníků 15 - 25 mm, u sportovních 30 - 45 mm). Při seči by neměla být odstraněna více než 1/3 výšky porostu.

Frekvence secí trávníku je ovlivňována úrovní výživy a zavlazování. Po jarním růstu (březen a duben) začíná nejintenzivnější růst v květnu a červnu. V letních

měsících se díky častému suchu projevuje růstová deprese. K mírnému oživení dochází v září. Všeobecně se dá říci, že do časného léta sečeme nejméně 1 x týdně, později 1 x za dva týdny.

Živiny pro trávník

Trávy v trávníku potřebují k růstu určité množství základních živin. Ty hlavní, dusík, fosfor a draslík, mají být zastoupeny v poměru 6 : 2 : 3 - 4. Běžné roční dávky fosforu a drasla aplikujeme v září, kdy jsou vhodné vláhové i teplotní podmínky pro jejich příjem. Dusík aplikujeme ve více ročních dávkách (od časného jara do poloviny září). Jednorázová dávka dusíku by neměla překročit 5g/m².

Plevely

Regulace plevelů v trávnících je silně individuální. Jde-li o ošetření proti plevelům přímo v trávníku, provádíme po vyklíčení trav a plevelů první odplevelující seč. K chemické ochraně přistupujeme uvážlivě. Musí se posoudit především škodlivost plevelů a jejich vlastnosti. Výhodou podzimního zakládání porostu například je, že při zaplevelení bérovitými plevely, jako ježatka kuří noha, ji zničí první větší mrazíky a chemická ochrana je zbytečná, navíc velmi problematická. Na druhé straně i vymrzající dvouděložné plevele jako ohnice nebo hořčice, jsou pro rozvíjející se trávník velkým konkurentem a po zmrnutí mohou být pod odumřelými listy vytvářeny vhodné podmínky pro houbové choroby. V tomto případě lze proto doporučit chemické ošetření. Provádí se na obrostlý trávník, cca 5 - 10 dnů po pokosení (dle teplot a intenzity růstu). Ošetření provádíme ve dnech kdy nehrozí noční mrazík, nejlépe za slunných dnů, kdy teplota přesáhne 8 - 10 °C. K ošetření je vhodný Basagran super, Bofix nebo kombinace Aritox + Lontrel 300 + Starane. K nejdůležitějším opatřením patří osečení

porostu před nástupem zimy. Pokud by se na porostu vyskytly houbové choroby, což se stává výjimečně, je nutné konzultovat ošetření s odborníky. Je dobré si připomenout, že tráva z porostů ošetřených clopyralidem (Bofix, Lontrel) není vhodná pro kompostování. Kompost z této hmoty může poškodit některé plodiny citlivé na clopyralid.

Ochrana proti škůdcům a chorobám

Ochrana proti chorobám a škůdcům není jednoduchá záležitost. Ve fytopatologii trávníků je třeba počítat s tím, že původce onemocnění je přítomen vždycky. Projeví se však jen tehdy, když se vyskytnou pro chorobu příznivé vnější podmínky nebo když je travní porost z různých příčin oslaben. Mezi nejčastější onemocnění trávníku patří - plíseň sněžná, travní rzi, stéblová, antraknóza trav a suchá skvrnitost. Ochrana proti chorobám a škůdcům lze rozdělit do dvou typů - přímá a nepřímá. K přímé ochraně patří herbicidy, fungicidy, případně další chemické přípravky. Nepřímou ochranou rozumíme správnou péči o porost. Kombinací dvou typů dosáhneme zdravého trávníku. Doporučit lze i preventivní ošetření fungicidy, zejména před zimou, proti fuzariózám a plísní sněžné.

ing. Urbanová Eva

Foto: Rožnovská travní semena, s.r.o.



Rožnovská travní semena, s.r.o.
Meziříčská 100
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel. 571 654 651-2
obchodní oddělení 571 656 651
Fax. 571 654 653
e-mail: rts@ro.inext.cz
www stránky - www.inext.cz/rts

